



Přetížení tractus iliotibialis (m. tensor fasciae latae)

4. Kineziologický aspekt: objevuje se bolestivost v bederní krajině, suspektní blok articulatio sacroiliaca, blok caput fibulae.



Přetížení tractus iliotibialis (m. tensor fasciae latae)

4. Kineziologický aspekt: objevuje se bolestivost v bederní krajině, suspektní blok articulatio sacroiliaca, blok caput fibulae.



Přetížení tractus iliotibialis (m. tensor fasciae latae)

4. Kineziologický aspekt: objevuje se bolestivost v bederní krajině, suspektní blok articulatio sacroiliaca, blok caput fibulae.



Přetížení tractus iliotibialis (m. tensor fasciae latae)

4. Kineziologický aspekt: objevuje se bolestivost v bederní krajině, suspektní blok articulatio sacroiliaca, blok caput fibulae.



Přetížení tractus iliotibialis (m. tensor fasciae latae)

4. Kineziologický aspekt: objevuje se bolestivost v bederní krajině, suspektní blok articulatio sacroiliaca, blok caput fibulae.

181



Přetížení tractus iliotibialis (m. tensor fasciae latae)

4. Kineziologický aspekt: objevuje se bolestivost v bederní krajině, suspektní blok articulatio sacroiliaca, blok caput fibulae.

182

